

**L'orticaria, caratterizzata dalla presenza di pomfi di dimensioni variabili, e l'angioedema, cioè il "rigonfiamento" dermico di solito facciale, non sono ...**

problemi frequenti nel cane e non sappiamo molto della loro causa. Si tratta di processi infiammatori tipicamente associati a una reazione di ipersensibilità immediata, cioè una allergia dovuta alla liberazione di mediatori da parte dei mastociti, in particolare istamina. Sono per lo più fenomeni transitori ma richiedono l'attenzione del Medico Veterinario, soprattutto se l'angioedema coinvolge le vie respiratorie o se compaiono segni clinici sistemici, quali disturbi gastroenterici, debolezza, ipotensione. Cioè segni suggestivi di reazione allergica più grave, come può accadere nello shock anafilattico, potenzialmente fatale specie se non trattato immediatamente. Orticaria ed angioedema sono sempre stati comunemente attribuiti a reazioni allergiche a punture di insetti oppure a reazioni allergiche nei confronti di farmaci.

In uno studio recente eseguito in Svizzera su 24 cani con orticaria è stato possibile identificare la causa del problema in 17 casi:

- Punture o morsi di insetti in 9 cani
- Allergia alimentare causata da patate, riso, formaggio, noci, carne bovina in 5 cani
- Farmaci in 2 cani
- Freddo in un cane

È interessante notare che l'allergia alimentare può frequentemente causare orticaria, angioedema e anche problemi sistemici simili allo shock anafilattico, al pari di quanto accade in medicina umana, soprattutto in età pediatrica.



**Triggers, risk factors and clinico-pathological features of urticaria in dogs – a prospective observational study of 24 cases.**

Rostaher A, Hofer-Inteeworn N, Kummerle-Fraune C, Fischer N M and Favrot C

